Hexolobodon phenax

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Hexolobodon phenax (Miller, 1929) era un <u>roditore</u> diffuso nell'<u>isola</u> di Santo Domingo e nell'isola di <u>Gonâve</u> (Haiti), attualmente <u>estinto</u>.

Note

1. <u>^ (EN)</u> Hexolobodon phenax, su <u>IUCN Red List of</u> Threatened Species, Versione 2019.2, IUCN, 2019.

Altri progetti

Wikispecies (https://species.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene informazioni su Hexolobodon phenax (https://species.wikimedia.org/wiki/Hexolobodon_phenax?uselang=it)

Collegamenti esterni

- Scheda sul sito dell'Università del Wisconsin, su uwsp.edu.
 URL consultato il 28 febbraio 2007 (archiviato dall'<u>url originale</u> il 17 marzo 2005).
- Elenco sul sito dell'Università del Wisconsin, su uwsp.edu. URL consultato il 28 febbraio 2007 (archiviato dall<u>'url originale</u> il 16 luglio 2006).

Hexolobodon phenax



PUOI CONTRIBUIRE AGGIUNGENDONE UNA CON LICENZA LIBERA

Stato di conservazione



Estinto (1500)[1]

Classificazione scientifica

Dominio Eukaryota

Regno Animalia

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Classe Mammalia

Superordine Euarchontoglires

(clade) Glires

Ordine Rodentia

Sottordine Hystricomorpha

Famiglia Capromyidae

Genere Hexolobodon

Specie H. phenax

Nomenclatura binomiale

Hexolobodon phenax

MILLER, 1929

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexolobodon_phenax&oldid=105399620"

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le <u>condizioni d'uso</u> per i dettagli.